

## LEY DE VACUNACIÓN PARA ESTUDIANTES REQUISITOS SEGUN EDAD/GRADO AÑO ESCOLAR 2012-2013

Las siguientes son las vacunas mínimas que se requieren para cada nivel de edad/grado. Este no es un programa de vacunas recomendado para bebés y niños de edad preescolar. Para ese programa, consulte a su médico o al departamento de salud local.

Edad/Grado	Número de Dosis					
Pre Kinder (2 a 4 años)	4 DTP/DTaP/DT <sup>2</sup>	3 Polio	3 Hep B	1 MMR <sup>5</sup>	1 Var <sup>6</sup>	
Grado K a 4	4 DTP/DTaP/DT/Td <sup>1</sup>	4 Polio <sup>4</sup>	3 Hep B	2 MMR <sup>5</sup>	2 Var <sup>6</sup>	
Grado 5	4 DTP/DTaP/DT/Td <sup>2</sup>	4 Polio <sup>4</sup>	3 Hep B	2 MMR <sup>5</sup>	1 Var <sup>6</sup>	
Grado 6 a 10	4 DTP/DTaP/DT/Td <sup>2</sup>	1 Tdap <sup>3</sup>	4 Polio <sup>4</sup>	3 Hep B	2 MMR <sup>5</sup>	2 Var <sup>6</sup>
Grado 11	4 DTP/DTaP/DT/Td <sup>2</sup>	1 Tdap <sup>3</sup>	4 Polio <sup>4</sup>	3 Hep B	2 MMR <sup>5</sup>	1 Var <sup>6</sup>
Grade 12	4 DTP/DTaP/DT/Td <sup>2</sup>	1 Tdap <sup>3</sup>	4 Polio <sup>4</sup>	3 Hep B	2 MMR <sup>5</sup>	2 Var <sup>6</sup>

1. DTP/DTaP/DT vacuna para los niños que ingresan a Kindergarten: Su hijo(a) debe haber recibido una dosis después de cumplir 4 años (ya sea en el 3er., 4to. o 5to. dosis) para ser aceptado. (Nota: es aceptable una dosis 4 días antes o al cumplir 4 años).
2. DTP/DTaP/DT/Td vacuna para estudiantes que ingresan a grados 1 al 12: Se requieren 4 dosis. Pero, si su hijo(a) recibió la 3ra. dosis después de cumplir 4 años, no necesita dosis adicionales. (Nota: Es aceptable una dosis 4 días antes o al cumplir 4 años).
3. Tdap es la vacuna antitetánica, antidiftérica y antitosferínica acelular, recomendada para los adolescents. Si su hijo(a) ha recibido una dosis de una vacuna antitetánica o antidiftérica como la vacuna Td en los últimos 5 años, no es necesaria la vacuna Tdap.
4. La vacuna antipolioméltica para estudiantes que ingresan a los grados Kindergarten a 12: Se requieren 4 dosis. Pero, si su hijo(a) recibió la 3ra. dosis después de cumplir 4 años, no necesita dosis adicionales. (Nota: Es aceptable una dosis 4 días antes o al cumplir 4 años).
5. La primera dosis de la vacuna MMR debe recibirse al cumplir un año o después de un año de edad. (Nota: Es aceptable una dosis 4 días antes de cumplir un año).
6. Var se refiere a la vacuna contra la varicela (viruelas locas). También se acepta si ha tenido la varicela.

### El departamento de la salud del condado de Washington libera la clínica Las inmunizaciones serán dadas por la cita

Las inmunizaciones de la niñez del \*\* se proporcionan gratuitamente a través de \*\* de la edad 18  
 El padre del \*\* A o el guarda legal debe acompañar a niños bajo \*\* de la edad 18  
 El \*\* trae por favor el expediente de la inmunización de su niño adelante a cada \*\* de la clínica

**Si usted no trae su expediente, no podremos inmunizar a su niño**

**Para programar una cita de la inmunización**

**Llame por favor 262-335-4462, presionan "0" para hablar a la recepcionista**

El departamento de la salud del condado de Washington está situado en el centro público de la agencia en  
 333 E. St. de Washington, en la curva del oeste  
 Para su conveniencia, el parquear está disponible apagado de la avenida de Indiana  
 Para más información visite por favor nuestro Web site en [www.co.washington.wi.us](http://www.co.washington.wi.us)